

## Mathematik II für Biologen

Übungsblatt 6 (Abgabe am 22.05.2015)

---

### Aufgabe 18

(10 Punkte)

- a) (Fortsetzung von Aufgabe 14) Im Beispiel aus Aufgabe 14 tritt ein Fehler 1. Art ein, wenn der Konkurrent aufgrund des Testergebnisses beschuldigt wird, minderwertige Schnüre zu verkaufen, obwohl seine Schnüre die 15 kg i.A. aushalten. (Die Wahrscheinlichkeit für einen derartigen Fehler ist höchstens so groß wie das Signifikanzniveau  $\alpha$ , falls  $H_0$  stimmt.) Ein Fehler 2. Art tritt auf, wenn die Schnüre tatsächlich minderwertig sind, der Test dies jedoch nicht nachweisen kann. Beschreiben Sie analog für die Fragestellungen aus Aufgabe 14, Teile a-e, was jeweils ein Fehler 1. Art bedeuten würde, und was ein Fehler 2. Art.
- b) (Fortsetzung von Aufgabe 8) Wir möchten mithilfe eines statistischen Tests, der die Daten aus <http://xkcd.com/715/> verwendet, entscheiden, ob der im Mittel von Internetnutzern angegebene IQ signifikant von dem des Bevölkerungsdurchschnitts (100, laut Definition) abweicht. Dann lautet die Nullhypothese  $H_0$ : *Internetnutzer geben im Mittel einen IQ von 100 an* und die Alternativhypothese  $H_A$ : *Internetnutzer geben im Mittel einen IQ ungleich 100 an*. Als Stichprobe verwenden wir die google-Daten, die in dem Comic graphisch dargestellt sind. Als Teststatistik  $X$  wählen wir den Mittelwert der IQ-Werte aus der Stichprobe, 147. Beschreiben Sie analog eine Fragestellung, die Sie mit den Daten, die Sie in Aufgabe 8 ermittelt haben, bearbeiten könnten. Geben Sie, wie oben, Nullhypothese, Alternativhypothese und eine geeignete Teststatistik an. (Notieren Sie auch nochmals, welchen Ausdruck sie gegoogelt haben.)

### Aufgabe 19 MATLAB (Fortsetzung von Aufgabe 17)

(10 Punkte)

Ändern Sie das MATLAB Programm aus Aufgabe 17 ab, um damit folgende Fragen zu beantworten. Hierbei bezeichnet  $p$  die (unbekannte) Wahrscheinlichkeit, dass man mit Ihrem Würfel eine 1 würfelt, d.h. in einem Anteil  $p$  von sehr, sehr vielen Würfeln zeigt der Würfel eine 1.

- a) Angenommen, jemand schlägt vor, genau dann die Nullhypothese  $H_0$  : *Die 1 kommt mit der richtigen Häufigkeit vor, d.h.  $p = \frac{1}{6}$* , zu verwerfen und stattdessen an die Alternativhypothese  $H_A$  : *Die 1 kommt zu häufig oder zu selten vor, d.h.  $p \neq \frac{1}{6}$* , zu glauben, wenn bei der einmaligen Durchführung des Experimentes entweder  $X \leq 9$  oder  $X \geq 25$  beobachtet wurde. Weiterhin werde angenommen, dass  $p = \frac{1}{5}$  gilt, d.h. dass der Würfel tatsächlich unfair ist, weil die 1 langfristig in 20% der Fälle auftaucht, und nicht nur in 16.67%, wie dies bei einem fairen Würfel der Fall sein sollte. Wie groß ist dann näherungsweise die Wahrscheinlichkeit, dass  $H_0$  tatsächlich verworfen wird? (Diese Wahrscheinlichkeit ist die sogenannte *Macht des Tests*.)
- b) Laut Vorlesung enthält das  $(1 - \alpha)$ -Vertrauensintervall für  $p$  diejenigen Werte  $p_0$ , für die die Nullhypothese  $H_0 : p = p_0$  auf dem Signifikanz-Niveau  $\alpha$  nicht verworfen wird, falls  $X = 12$  (die tatsächliche Beobachtung) beobachtet wird. Welche der Werte  $p_0 = 0; 0,05; 0,1; 0,15; 0,20; 0,25; 0,3$  gehören zum 95%-Vertrauensintervall für  $p$ ? (Wir werden später eine Formel kennenlernen, die das Vertrauensintervall ohne Simulation näherungsweise bestimmt.)

HINWEIS: Neben Aufgabe 17 hilft vielleicht auch ein Blick auf den MATLAB-Code von Aufgabe 20.

## Aufgabe 20

(10 Punkte)

Gregor Mendel untersuchte zwei Merkmale von Erbsen: Die Form der Erbsen konnte rund (A, dominant) oder kantig (a, rezessiv) sein und das Albumen gelb (B, dominant) oder grün (b, rezessiv). Es wurden Samen von homozygoten Pflanzen mit den dominierenden Merkmalen A und B gekreuzt mit Pollen von homozygoten Pflanzen mit den rezessiven Merkmalen a und b. Das Resultat: “Die befruchteten Samen erschienen rund und gelb, jenen der Samenpflanze ähnlich.” Die “befruchteten Samen” (Erbsen) haben ja alle den Genotyp AaBb, d.h. sie tragen die “Allele” A und a im Verhältnis 1:1 in sich, ebenso B und b. “Die daraus gezogenen Pflanzen gaben Samen von vielerlei Art, welche oft gemeinschaftlich in einer Hülse lagen. Im Ganzen wurden von 15 Pflanzen 556 Samen erhalten, von diesen waren:

315	rund und gelb
101	kantig und gelb
108	rund und grün
32	kantig und grün.”

Nach den Mendelschen Gesetzen müssten die Wahrscheinlichkeiten für die vier Phänotypen im Verhältnis 9:3:3:1 stehen. D.h. man würde “erwarten”, dass 9/16 der Erbsen, also 312,75 Erbsen, rund und gelb sind. Die Übereinstimmung mit den tatsächlichen Daten ist für diesen Phänotyp also schon relativ gut. Ist sie insgesamt gut genug, dass man sagen kann, dass die Daten dem Mendelschen Modell nicht widersprechen, oder sollte man erwarten, dass die Daten noch besser den Vorhersagen von Mendel genügen sollten?

- a) Berechnen Sie (wahlweise mit Taschenrechner oder mit MATLAB) die folgende Teststatistik  $T$ , die in einer einzigen Zahl zusammenfassen soll, wie gut die Daten zu der Nullhypothese  $H_0$  passen, dass die Erbsen dem Mendelschen Modell folgen.

$$T := \sum_{i=1}^4 \frac{(n_i - m_i)^2}{m_i},$$

wobei

- die 4 Gruppen “rund und gelb”, “kantig und gelb”, “rund und grün” und “kantig und grün” mit  $i = 1, 2, 3$  und  $4$  durchnummeriert wurden,
  - $n_i$  die tatsächlich beobachtete Anzahl von Erbsen in der Gruppe  $i$  und
  - $m_i$  die erwartete Anzahl von Erbsen in Gruppe  $i$  ist (falls Mendel recht hat).
- b) Welche Werte von  $T$  sprechen am meisten dafür, dass das Mendelsche Modell nicht stimmt, d.h. dass die Alternativhypothese  $H_A$  gilt? Große oder kleine Werte? Warum?
- c) (MATLAB) Um zu entscheiden, ob die tatsächlich beobachteten Häufigkeiten der einzelnen Ausprägungen nur im üblichen Rahmen um die erwarteten Häufigkeiten streuen oder ob sie stärker davon abweichen, als dies der Fall sein sollte, wenn Mendels Modell stimmt, simulieren Sie bitte  $n = 10000$  Mal die Erzeugung von 556 Erbsen nach Mendels Regeln und berechnen Sie jeweils den Wert von  $T$  aus Aufgabe (a). Zeichnen Sie ein Histogramm der so erhaltenen Werte von  $T$ . In wieviel Prozent der simulierten Fälle spricht der Wert von  $T$  noch stärker für  $H_A$ , als dies die echten Daten tun? (Dies ist eine Schätzung für den p-Wert.) Würde demnach  $H_0$  auf dem Signifikanzniveau  $\alpha = 10\%$  zugunsten von  $H_A$  verworfen werden? MATLAB (unvollständig):

```
>> n=10000; % Anzahl von Wiederholungen des Experimentes
>> erw=556/16*[9,3,3,1] % erwartete Anzahl in jeder Gruppe
>> x=rand(556,n); % Fuer jede Erbse wird eine Zufallszahl
% zwischen 0 und 1 erzeugt.
>> rundgelb=sum(x<9/16); % Erbse wird rund und gelb, falls Zufallszahl <9/16.
% rundgelb = Anzahl runder und gelber Erbsen
>> kantiggelb=sum(9/16<=x & x<12/16);
>> rundgruen=???
>> kantigruen=???
>> T=(rundgelb-erw(1)).^2/erw(1)+(kantiggelb-erw(2)).^2/erw(2)+???;
>> hist(T,20)
```